

109. Fiebre desconocida Quemaduras

Fiebre desconocida

Presencia de fiebre $>38^{\circ}\text{C}$ durante un periodo superior a 8 días y en la que se ha realizado una anamnesis, exploración física y estudios complementarios iniciales de forma exhaustiva (hospitalarios o ambulatorios) sin diagnóstico aparente.

Causas

Infeciosas

Autoinmunes

Enfermedades malignas

Otras: diabetes insípida, enfermedad de Kawasaki,

Mayor edad y mayor duración de la fiebre menor probabilidad de que sea infecciosa y más probabilidad que sea autoinmune o tumoral.

La mayoría son auto limitadas y benignas.

<https://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2014-01/fiebre-de-origen-desconocido/>

Quemaduras

Según la profundidad:

Primer grado: solo se afecta la capa más superficial de la piel (epidermis). El ejemplo típico es la quemadura solar. Son dolorosas pero no dejan secuelas estéticas.

Segundo grado: afecta a la epidermis y a la capa más profunda, la dermis. Son dolorosas y producen ampollas.



Tercer grado: afecta a todo el espesor de la piel destruyendo las terminaciones nerviosas, por lo que, a pesar de su gravedad, no duelen.

Según la extensión (para calcularla en los niños se puede utilizar la palma de la mano que equivale al 1% de la superficie corporal):

-
-

Leves: afecta a menos del 10% de la superficie corporal. Se pueden tratar en casa.

Graves: está afectada entre el 10% y el 30% de la superficie corporal. Suelen requerir ingreso hospitalario.

Muy graves: afecta a más del 30% de la superficie corporal y la atención se debería proporcionar en una unidad de cuidados intensivos.