

109.-Genitales

Vulvovaginitis

DEFINICION: La Vulvovaginitis se define como la inflamación de la vulva y de la vagina que compromete la piel vulvar, la mucosa vestibular y el tercio inferior de la vagina.

La presencia de flujo es un hecho fisiológico por estímulo estrogénico en la recién nacida y en la pubertad. En ambos casos el flujo blanquecino está presente sin inflamación local o prurito y se denomina leucorrea. Por lo tanto, la secreción vaginal en las niñas, fuera del período neonatal o puberal es siempre anormal. Los síntomas que suelen presentarse son flujo, prurito y/o disuria.

FACTORES PREDISPONENTES

Existen diferentes factores que condicionan la aparición de vulvovaginitis en la niña:

- 1) La presencia de un epitelio vaginal atrófico, que carece de glucógeno y lactobacilos, con PH neutro, condicionado por el bajo nivel de estrógenos.
- 2) La cercanía anatómica en estas edades, de los orificios anal, vaginal y uretral, así como el escaso desarrollo ectodérmico de vulva (labios mayores y menores), con escasa secreción sebácea y ausencia de vello pubiano.
- 3) Los hábitos exploratorios y masturbatorios propios de la edad: favorecen la inoculación de gérmenes en la vagina.
- 4) La presencia de factores desencadenantes como la mala higiene (excesiva o inadecuada), los malos hábitos de secado y el uso inapropiado del bidet provocan contaminación con gérmenes del tracto intestinal.

5) Uso de ropa interior de nailon o lycra, o ropa ajustada y contacto con jabones perfumados o espumas para baño.

ETIOLOGÍA

Las vulvovaginitis se clasifican de acuerdo al agente etiológico en Inespecíficas y Específicas.

A) VULVOVAGINITIS INESPECIFICA:

Dentro de la vulvovaginitis inespecífica, aproximadamente el 30%, es secundaria a oxiurus. Suelen referir prurito anal, anovulvar y nasal, llanto súbito nocturno o sueño intranquilo y bruxismo.

VULVOVAGINITIS ESPECÍFICA:

Están provocadas por gérmenes que no forman parte de la flora endógena vaginal. Se pueden clasificar de acuerdo al origen del agente infeccioso.

ORIGEN INTESTINAL

Shigella: La infección por *Shigella flexneri* es frecuente en niñas.

Cándida: Es frecuente en la etapa puberal y en las lactantes por el uso del pañal.

ORIGEN DÉRMICO

Entre los gérmenes respiratorios se encuentran:

Streptococcus pyogenes (Estreptoco β hemolítico del grupo A) Las vulvovaginitis agudas son frecuentes y típicamente ocurren en etapas tempranas del desarrollo y raramente luego de la aparición de la menarca.

El ***Estafilococo aureus*** además de la infección vaginal, puede producir lesiones impetiginosas en vulva y glúteos. El antibiótico de elección cefalexina o trimetoprima+sulfametoxazol.

ORIGEN RESPIRATORIO

H. Influenzae* y *S.pneumoniae se presentan con cuadros de vulvovaginitis purulentas, caracterizadas por flujo abundante, con prurito, eritema o disuria. Es frecuente su aparición en forma conjunta con cuadro de catarro de vías aéreas superiores.