

ABRIL ULTIMAS NOTICIAS

Suicidio: plan para la prevención del suicidio juvenil

El suicidio y el comportamiento suicida entre jóvenes y adultos jóvenes es una importante crisis de salud pública. El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años de edad en los Estados Unidos (EE. UU.), y las tasas han ido en aumento durante décadas.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio (AFSP), en colaboración con expertos del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), crearon este Plan para la Prevención del Suicidio Juvenil como un recurso educativo para apoyar a los médicos de salud pediátrica y otros profesionales de la salud en la identificación de estrategias y alianzas clave para apoyar a los jóvenes en riesgo de suicidio.

<https://www.aap.org/en/patient-care/blueprint-for-youth-suicide-prevention/>

La hidratación intravenosa rápida no afecta los resultados clínicos de la gastroenteritis

La práctica actual de administrar fluidos intravenosos rápidos (FIV) a niños con gastroenteritis aguda no da como resultado un alta temprana ni reduce la probabilidad de una nueva visita al departamento de emergencias (SU). Estos fueron los hallazgos principales de un estudio retrospectivo realizado con 284 pacientes, desde bebés hasta adolescentes, que habían recibido un diagnóstico de gastroenteritis aguda y deshidratación moderada en un servicio de urgencias de Arabia Saudita.

Enfoques integradores de los trastornos gastrointestinales comunes

En la Reunión de Sociedades Académicas de Pediatría de 2022, Alexandra Russell, MD, analiza las mejores medicinas complementarias y alternativas para los trastornos gastrointestinales pediátricos.

El tratamiento de los trastornos gastrointestinales (GI), como el síndrome del intestino irritable, la enfermedad celíaca (EC) y la colitis, está limitado cuando se trata de medicamentos estándar y otras intervenciones médicas convencionales.

La única cura real conocida para la EC, por ejemplo, es una dieta libre de gluten de por vida, y el síndrome del intestino irritable a menudo se trata agregando fibra a la dieta de un niño, entrenamiento intestinal y otros enfoques no farmacológicos.

Con esto en mente, Alexandra Russell, MD, del Monroe Carell Jr. Children's Hospital en Vanderbilt en Nashville, Tennessee, ofreció una discusión animada e informativa sobre tratamientos alternativos para aliviar el dolor y la incomodidad asociados con varios trastornos gastrointestinales en los niños.

¿Los niños en edad preescolar con TDAH reciben la terapia conductual que necesitan?

24 de abril de 2022

En la reunión de las Sociedades Académicas de Pediatría de 2022, Shruti Mittal, MD, FAAP, observó cuántos niños con trastorno por déficit de atención/hiperactividad comienzan con la terapia conductual antes de la medicación en los años preescolares.

Con las pautas existentes de la Academia Estadounidense de Pediatría y la Sociedad de Pediatría del Desarrollo y del Comportamiento que recomiendan la terapia conductual (TC) como tratamiento de primera línea para niños en edad preescolar con trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH), Shruti Mittal, MD, FAAP, profesor asistente y pediatra del desarrollo y la conducta en el Levine Children's Hospital en Matthews, Carolina del Norte, se propuso presentar la frecuencia y los factores asociados con la recepción de BT documentada por un médico en niños en edad preescolar con TDAH.

"Hasta donde sabemos, ningún estudio ha examinado este recibo de BT de los médicos, antes del inicio de la medicación", explicó. También hay investigaciones limitadas con detalles proporcionados sobre tipos específicos de terapia conductual que reciben estos niños.

Moderna pide a la FDA que autorice la vacuna COVID-19 en niños pequeños

Moderna pide a la FDA que autorice la vacuna COVID-19 en niños pequeños

Moderna anunció hoy que ha presentado una solicitud a la FDA para autorizar su vacuna COVID-19 en niños de tan solo 6 meses.

Las alergias a las legumbres son más comunes entre los niños con múltiples alergias alimentarias

Las alergias a las legumbres son más comunes entre los niños con múltiples alergias alimentarias

Las alergias a las legumbres parecían más comunes entre los niños con múltiples alergias alimentarias, y la mayoría de estos niños eran alérgicos a múltiples legumbres, según un estudio realizado en Turquía y publicado en *Pediatric Allergy and Immunology*.

La mayoría de los niños inmunocomprometidos aumentan la respuesta a dos dosis de la vacuna COVID-19

DENVER — Un estudio de niños inmunocomprometidos encontró que la mayoría desarrolló una respuesta inmunológica después de dos dosis de la vacuna COVID-19, que aumentó modestamente después de una tercera dosis, informaron investigadores en la Reunión de Sociedades Académicas Pediátricas.

Brote misterioso de hepatitis grave en niños provoca vigilancia en todo el mundo

Brote misterioso de hepatitis grave en niños provoca vigilancia en todo el mundo

La OMS ha informado al menos 169 casos de hepatitis aguda grave en niños de 1 mes a 16 años de una docena de países en todo el mundo, según un comunicado de la organización.

Los síntomas asociados con el brote incluyen dolor abdominal, diarrea y vómitos, que pueden progresar a una hepatitis aguda grave con enzimas hepáticas elevadas e ictericia.

Se ha detectado adenovirus en al menos 74 casos, y de ellos, el tipo F 41 se identificó en 18 que se sometieron a pruebas moleculares. Además, se identificó SARS-CoV-2 en 20 casos y 19 casos fueron diagnosticados con coinfección por SARS-CoV-2 y adenovirus.

La tasa de muertes por sobredosis de adolescentes se disparó durante la pandemia, según un estudio.

La tasa de muertes por sobredosis de adolescentes se disparó durante la pandemia, según un estudio

La tasa de muertes por sobredosis entre los adolescentes de EE. UU. aumentó exponencialmente durante la pandemia de COVID-19, por primera vez, incluso cuando el consumo de drogas se mantuvo estable, encontraron los investigadores.

Muerte de los padres asociada con bajo rendimiento escolar

La muerte de los padres en la infancia se asocia con un rendimiento escolar más bajo, y aquellos que experimentan esta pérdida pueden beneficiarse del apoyo que podría prevenir futuros resultados adversos, según un estudio publicado en JAMA Network Open.

Macrocefalia

La macrocefalia (cabeza grande) es un trastorno del crecimiento craneal del bebé. Dependiendo de sus causas puede tener buen pronóstico, o interferir en el neurodesarrollo del niño

¿Cuándo se considera que el bebé tiene macrocefalia?

El tiempo de televisión relacionado con la mala alimentación en los niños pequeños

Los niños pequeños que veían más televisión eran significativamente más propensos que los que miraban menos a consumir bebidas azucaradas y comida chatarra, según datos de 529 niños.

La Academia Estadounidense de Pediatría actualmente recomienda no usar medios digitales para niños menores de 18 a 24 meses, y una hora o menos al día para niños de 2 a 5 años.

Los casos de sarampión aumentan un 79 % en 2022 después de que el COVID golpeó las campañas de vacunación



LONDRES (Reuters) - Los casos de sarampión aumentaron un 79% en los dos primeros meses de este año en comparación con 2021, después de que el COVID-19 y los confinamientos interrumpieran las campañas de vacunación infantil en todo el mundo, según datos de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS). .

En enero y febrero, se informaron 17.338 casos de sarampión en todo el mundo, frente a los 9.665 del mismo período del año pasado.

Solicite el artículo deseado a info@tuconsultorioidigital.com.ar