

Hígado graso no alcohólico prevalente en adolescentes, adultos jóvenes

Dos quintas partes de los adolescentes y adultos jóvenes en los Estados Unidos tienen fibrosis hepática significativa y enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) y enfermedad del hígado graso asociada al alcohol (ALD) sugieren los resultados de un estudio de vigilancia a nivel nacional.

Además, entre los que beben alcohol en exceso, un poco más de la mitad pueden tener enfermedad del hígado graso (EHA) asociada al alcohol que puede conducir a una fibrosis de moderada a severa en una proporción sustancial, dijo Naim Alkhouri, MD, de Arizona Liver Health en Peoria, Arizona, durante una presentación de los hallazgos en The Liver Meeting 2021: American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), realizada en línea.

"Los esfuerzos deben centrarse en aumentar la conciencia de la carga de ALD y NAFLD en esta población y mitigar los factores de riesgo modificables para prevenir el desarrollo de la enfermedad y la progresión de la enfermedad a la fibrosis y cirrosis potencialmente avanzadas ", dijo.

Fuente: NAFLD, ALD prevalente entre adolescentes, adultos jóvenes - Medscape - 19 de noviembre de 2021.

Leer más....